

Overvågning af dine pårørende for bivirkninger



Xaluritamig kan forårsage bivirkninger, der kan være alvorlige eller livstruende.

Kontakt straks din behandlende læge eller søg akut lægehjælp i følgende tilfælde:

- Feber (38,0 °C eller højere)
- Kuldegysninger eller kulderystelser
- Brystmerter
- Åndedrætsbesvær og/eller åndenød
- Hurtig puls
- Udslæt
- Kvalme, opkastning eller diarré
- Træthed eller svaghed
- Hovedpine
- Svimmelhed
- Forvirring, adfærdssændringer og taleforandringer



Xaluritamig kan også forårsage bivirkninger, der kan blive alvorlige, hvis de ikke diagnosticeres og behandles tidligt.

Følgende symptomer er ikke livstruende, men hvis de opstår, skal du kontakte din forsøgslæge.

- Muskelsmerter og/eller svaghed (rammer ofte arme, skuldre og ben)
- Smerter og/eller hævelse i øjne, ansigt, kæbe, hals/mund eller pungen; blister/sår i munden
- Nye eller forværrede eksisterende ledsmerter og/eller hævelse

Du er en værdsat del af dette forsøg.

Som plejer spiller du en vigtig rolle i overvågningen og plejen af din pårørende. I dette forsøg vil vi være afhængige af, at du holder øje med din pårørendes tilstand og hjælper dem med at følge vores instruktioner.

Din tilstedeværelse, dine observationer og din støtte har en enorm betydning for din pårørendes rejse med prostatakræft.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

De venligste hilsner

XALute-forsøgsteamet

Din forsøgslæge:

Telefon: _____

Din forsøgskoordinator:

Telefon: _____

E-mail: _____



Scan koden for at besøge
[\[www.xalutestudy.com\]](https://www.xalutestudy.com)
for flere oplysninger.

XALute

En vejledning til plejere for patienter i XALute-forsøget



Oversigt over 1. cyklus

1. cyklus omfatter 4 forsøgsbesøg. Din pårørende vil modtage en infusion med xaluritamid ved hvert af disse besøg.

Dag 1: Hospitalsophold over natten



Din pårørende vil blive indlagt til den første infusion og overvåges i mindst 16 timer efter infusionen. Forsøgslægen vil foretage en sidste undersøgelse af din pårørende, inden vedkommende får lov til at forlade hospitalet.

Dage 8, 15, 22: Ambulant overvågning



Der er ikke behov for hospitalsophold på disse infusionsdage. Forsøgslægen og -personalet vil overvåge din pårørende i 4 til 6 timer efter infusionen.



I løbet af 1. cyklus skal du og din pårørende opholde jer inden for 1 times afstand fra hospitalet, indtil der er gået 24 timer siden infusionen.



Sørg for, at din pårørende har patientkortet i sin tegnebog. Kortet angiver, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man skal gøre i tilfælde af bivirkninger.

2. cyklus og derefter



Indlæggelse eller længerevarende overvågning er ikke nødvendigt ved infusioner i cyklus 2 og derefter. Forsøgslægen vil beslutte, hvor længe din pårørende skal overvåges, og informere dig om, hvad du kan forvente.



Ved at lære, hvad du skal være opmærksom på, og ved at holde øje med din pårørende, kan du hjælpe med at sikre, at vedkommende hurtigt får den rette lægehjælp.



Pleje af din pårørende efter en infusion



Vær opmærksom på tegn og symptomer på en reaktion.



Hjælp din pårørende med at holde sig godt hydreret. Vedkommende bør drikke 2,5 liter vand om dagen.



Sørg for, at din pårørende tager eventuelle antiinflammatoriske lægemidler som anvist.



Vær tilgængelig for et opfølgende telefonopkald 24 timer efter infusionen. Dette kan foregå på forsøgsklinikken, hvis det er nødvendigt.



Kontakt straks din læge eller søg akut lægehjælp, hvis din pårørende oplever nogen af de symptomer, der er nævnt tidligere i denne brochure.



Vi værdsætter dit partnerskab, når vi samarbejder om at tage os af din pårørende under forsøget.