

Vær opmærksom på disse tegn og symptomer!

Som med alle lægemidler kan der være bivirkninger ved det lægemiddel, du får i forbindelse med forsøget. Det er vigtigt, at du ved, hvad du skal være opmærksom på, og at du straks rapporterer eventuelle symptomer eller ændringer i dit helbred til din forsøgslæge. Hurtig diagnose og behandling kan hjælpe med at fjerne bivirkningerne.

Føler sig syg

- Feber
- Kulderystelser
- Hovedpine
- Træthed
- Svimmelhed eller besvimelsesfornemmelse

Øjnene

- Hævelse omkring øjnene
- Gulfarvning af øjnene

Hjertet

- Hurtig puls

Muskler og led

- Smerter eller ømhed
- Svaghed

Huden

- Udslett
- Kløende eller gul hud
- Brændende, prikkende eller snurrende fornemmelse

Ben og ankler

- Hævelse

Neurologiske problemer

- Balance- eller koordinationsforstyrrelser
- Rystelser i arme og/eller ben
- Forvirring eller desorientering
- Problemer med at tale
- Hukommelsestab
- Personlighedsændringer

Munden og smag

- Smagsforandring, som kan være dårlig, sur, salt eller metallisk
- Vabler eller sår
- Smerter i munden

Halsen

- Smerter eller hævelse i halsen

Maven

- Kvalme eller opkastning
- Manglende appetit
- Mavesmerter

Kønsorganerne

- Hævelse af pungen

Fortæl din læge om alt, hvad der generer dig.

Se bagsiden af denne side for mere information.

XALURITAMIG

Cytokinreleasesyndrom(CRS) er en vigtig bivirkning, man skal være opmærksom på, når man tager xaluritamig. Symptomer på CRS omfatter feber, kulderystelser, hovedpine, lavt iltindhold i blodet, ændringer i blodtrykket, øget puls, kvalme eller opkastning og forhøjede leverenzzymer.

Kontakt din forsøgslæge eller tag på skadestuen, hvis du har feber (38,0 °C eller højere) eller andre symptomer på CRS.

Lokale inflammatoriske hændelser såsom muskelsmerter og betændelse er også forbundet med xaluritamig og kan forårsage bivirkninger, der kræver øjeblikkelig behandling for at forhindre forværring. Symptomerne omfatter:

- Muskel-/ledsmerter og/eller svaghed
- Smerter og/eller hævelse i øjnene, ansigtet, kæben, halsen/munden eller pungen/kønsorganerne.

Andre mulige bivirkninger ved xaluritamig er beskrevet mere detaljeret i din informerede samtykkeerklæring.

CABAZITAXEL

De mest almindelige bivirkninger er relateret til et lavt antal blodlegemer (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader), diarré, træthed og manglende energi og styrke.

ABIRATERONE ACETATE

De mest almindelige bivirkninger omfatter træthed, ledsmerter, forhøjet blodtryk, kvalme, hævelser, hedeture, diarré, opkastning, infektion i de øvre luftveje (som en almindelig forkølelse), hosten og hovedpine.

ENZALUTAMIDE

De mest almindelige bivirkninger er muskel-/ledsmerter, træthed, hedeture, forstoppelse, nedsat appetit, diarré, forhøjet blodtryk, blødning, fald, brud og hovedpine.

Dette er ikke alle bivirkninger. Din forsøgslæge kan give dig en patientbrochure med mere information om forsøgslægemidlet.



Scan koden eller gå ind på www.xalutestudy.com for yderligere materialer om forsøget.

Pinkode: [0509]