

¡Esté atento a estos signos y síntomas!

Como sucede con cualquier medicamento, existe la posibilidad de que el medicamento en investigación del estudio provoque efectos secundarios. Es importante estar atento a la aparición de síntomas y comunicar cualquier cambio o molestia al/a la médico/a del estudio lo antes posible. Un diagnóstico y tratamiento precoz pueden hacer que los efectos secundarios desaparezcan.

Malestar general

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Cansancio
- Mareos o sensación de desvanecimiento

Ojos

- Hinchazón alrededor de los ojos
- Color amarillento en los ojos

Corazón

- Latido cardíaco acelerado

Músculos y articulaciones

- Molestias o dolores
- Debilidad

Piel

- Erupción en la piel
- Picor o color amarillento de la piel
- Sensación de quemazón, pinchazos o cosquilleo

Piernas y tobillos

- Hinchazón

Problemas neurológicos

- Pérdida de equilibrio o coordinación
- Temblores en brazos y/o piernas
- Confusión o desorientación
- Dificultad para hablar
- Pérdida de memoria
- Cambios de personalidad

Boca y sentido del gusto

- Alteración del gusto (sabor desagradable, ácido, salado o metálico)
- Ampollas o llagas
- Dolor en la boca

Garganta

- Dolor o inflamación en la garganta

Abdomen

- Náuseas o vómitos
- Pérdida de apetito
- Dolor abdominal

Genitales

- Hinchazón del escroto

Informe al/a la médico/a del estudio de cualquier cosa que le cause malestar.

Consulte el reverso de esta página para más información.

XALURITAMIG

El síndrome de liberación de citoquinas (SLC) es un efecto secundario importante al que debe prestarse especial atención durante el tratamiento con xaluritamig. Entre los síntomas se incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, niveles bajos de oxígeno en sangre, cambios en la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, náuseas o vómitos y elevación de enzimas hepáticas.

Póngase en contacto con su médico/a del estudio o acuda a urgencias si presenta fiebre ($\geq 38,0$ °C) o cualquier otro síntoma de SLC.

También se han observado acontecimientos inflamatorios localizados, tales como dolor e inflamación muscular, asociados al xaluritamig y que podrían provocar efectos secundarios y requerir tratamiento inmediato para evitar su empeoramiento. Entre los síntomas se incluyen:

- Dolor y/o debilidad muscular/articular
- Dolor y/o inflamación en los ojos, cara, mandíbula, garganta/boca o zona escrotal/genital

Se describen en mayor detalle otros posibles efectos secundarios de xaluritamig en el documento de consentimiento informado.

CABAZITAXEL

Los efectos secundarios más frecuentes están relacionados con la reducción de los niveles de células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), diarrea, cansancio y falta de energía o fuerza.

ACETATO DE ABIRATERONA

Entre los efectos secundarios más frecuentes se incluyen cansancio, dolor articular, hipertensión, náuseas, hinchazón, sofocos, diarrea, vómitos, infección de vías respiratorias altas (por ejemplo resfriado), tos y dolor de cabeza.

ENZALUTAMIDA

Los efectos más frecuentes son dolor muscular o articular, cansancio, sofocos, estreñimiento, pérdida de apetito, diarrea, hipertensión, hemorragias, caídas, fracturas y dolor de cabeza.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Su médico/a del estudio podrá facilitarle un folleto para el paciente con más información sobre el medicamento en investigación de su estudio.



Escanee el código o visite www.xalutestudy.com para acceder a recursos adicionales del estudio.

Código PIN: 0509