

Surveillance des effets secondaires de votre proche



Le xaluritamig peut provoquer des effets secondaires potentiellement graves ou engageant le pronostic vital.

Appelez immédiatement le médecin de l'étude ou contactez les urgences dans les cas suivants :

- Fièvre (38,0 °C ou plus)
- Frissons ou tremblements
- Douleur thoracique
- Difficulté à respirer et/ou essoufflement
- Rythme cardiaque accéléré
- Éruption cutanée
- Nausées, vomissements ou diarrhée
- Fatigue ou faiblesse
- Céphalées
- Vertiges ou étourdissements
- Confusion, altérations du comportement et de l'élocution



Le xaluritamig peut également provoquer des effets secondaires susceptibles de s'aggraver s'ils ne sont pas diagnostiqués et traités rapidement.

Les symptômes suivants ne mettent pas la vie en danger, mais s'ils surviennent, veuillez appeler le médecin de l'étude.

- Douleur et/ou faiblesse musculaire (affectant souvent les bras, les épaules et les jambes)
- Douleur et/ou gonflement des yeux, du visage, de la mâchoire, de la gorge/ bouche ou de la région scrotale ; aphtes/ plaies dans la bouche
- Apparition ou aggravation d'une douleur et/ou d'un gonflement articulaire existant

Vous jouez un rôle précieux dans cette étude.

En tant qu'aidant, vous jouez un rôle important dans la surveillance et la prise en charge de votre proche. Dans cette étude, nous comptons sur vous pour surveiller l'état de santé de votre proche et l'aider à suivre nos instructions.

Votre présence, vos observations et votre soutien ont un impact considérable sur le parcours de votre proche atteint du cancer de la prostate.

Si vous avez la moindre inquiétude, n'hésitez pas à nous contacter.

Bien à vous,

L'équipe de l'étude XALute

Votre médecin de l'étude :

Téléphone : _____

Votre coordinateur de l'étude :

Téléphone : _____

Courriel : _____

XALute 

Guide à l'intention des aidants de patients de l'étude XALute



Aperçu du cycle 1

Le cycle 1 comprend 4 visites d'étude. Votre proche recevra une perfusion de xaluritamig à chacune de ces visites.

Jour 1 : Séjour à l'hôpital

Votre proche sera hospitalisé pour la première perfusion et restera en observation pendant au moins 16 heures après la perfusion. Le médecin de l'étude procédera à un dernier examen de votre proche avant de le laisser quitter l'hôpital.



Jours 8, 15, 22 : Suivi des patients en ambulatoire

Ces jours de perfusion n'exigent pas d'hospitalisation. Le médecin et le personnel de l'étude garderont votre proche en observation pendant un minimum de 1 à 2 heures après la perfusion.



Pendant le cycle 1, votre proche et vous devrez rester à moins d'une heure de l'hôpital jusqu'à ce que 24 heures se soient écoulées après la perfusion.



Veillez à ce que votre proche ait sa carte de patient dans son portefeuille. La carte indique ce qu'il faut observer et ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires.



Cycle 2 et suivants

Les perfusions du cycle 2 et des cycles suivants n'exigent ni hospitalisation ni suivi prolongé. Le médecin de l'étude décidera de la durée du suivi de votre proche et vous informera de ce à quoi il faut s'attendre.



En vous informant sur les signes à surveiller et en gardant un œil sur votre proche, vous pouvez faire en sorte qu'il reçoive rapidement les soins médicaux appropriés.



Prendre soin de votre proche après une perfusion



Soyez à l'affût des signes et symptômes d'une réaction.



Aidez votre proche à rester bien hydraté. Il doit boire 11 verres ou 2,5 litres d'eau par jour.



Veillez à ce que votre proche prenne ses médicaments anti-inflammatoires conformément aux instructions.



Soyez prêt(e) à recevoir un appel téléphonique de suivi 24 heures après la perfusion. Cela peut avoir lieu au centre d'étude si nécessaire.



Appelez immédiatement le médecin de l'étude ou contactez les urgences si votre proche présente l'un des symptômes énumérés plus haut dans cette brochure.



Nous vous sommes reconnaissants de votre collaboration, car nous travaillons ensemble pour prendre soin de votre proche pendant l'étude.

