

Soyez attentif à ces signes et symptômes !

Comme pour tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires dus à votre médicament expérimental à l'étude. Il est important que vous sachiez à quoi faire attention et que vous signaliez immédiatement au médecin de l'étude tout symptôme ou changement dans votre état de santé. Un diagnostic et un traitement rapides peuvent permettre de faire disparaître les effets secondaires.

Sensation d'être malade

- Fièvre
- Frissons
- Maux de tête
- Fatigue
- Sensation de faiblesse ou de vertige

Yeux

- Gonflement autour des yeux
- Jaunissement des yeux

Cœur

- Rythme cardiaque accéléré

Muscles et articulations

- Courbatures ou douleurs
- Faiblesse

Peau

- Éruption cutanée
- Démangeaisons ou jaunissement de la peau
- Brûlures, picotements ou fourmillements

Jambes et chevilles

- Gonflements

Problèmes neurologiques

- Perte d'équilibre ou de la coordination
- Tremblements des bras et/ou des jambes
- Confusion ou sentiment de désorientation
- Troubles de l'élocution
- Perte de mémoire
- Altérations de la personnalité

Bouche et goût

- Altération du goût, qui peut être fétide, aigre, salé ou métallique
- Aphtes ou plaies
- Douleurs buccales

Gorge


- Mal de gorge et gonflement

Abdomen

- Nausées ou vomissements
- Perte d'appétit
- Douleurs abdominales

Parties génitales

- Gonflement du scrotum



Signalez tout ce qui vous dérange au médecin de l'étude.

Voir au dos de cette page pour plus d'informations.

XALURITAMIG

Le syndrome de relargage des cytokines (SRC) est un effet secondaire important à surveiller lors de la prise de xaluritamig. Les symptômes du SRC sont les suivants : fièvre, frissons, maux de tête, faible taux d'oxygène dans le sang, altérations de la tension artérielle, accélération du rythme cardiaque, nausées ou vomissements et augmentation des enzymes hépatiques.

Contactez le médecin de l'étude ou rendez-vous aux urgences si vous avez de la fièvre (38,0 °C ou plus) ou tout autre symptôme de SRC.

Des manifestations inflammatoires localisées, telles que des douleurs musculaires et des inflammations, sont également associées au xaluritamig et peuvent entraîner des effets secondaires nécessitant un traitement rapide pour éviter une aggravation. Les symptômes incluent :

- Douleur et/ou faiblesse musculaire/articulaire
- Douleur et/ou gonflement des yeux, du visage, de la mâchoire, de la gorge/bouche ou de la région scrotale/génitale.

Les autres effets secondaires potentiels du xaluritamig sont décrits plus en détail dans le Formulaire de consentement éclairé.

CABAZITAXEL

Les effets secondaires les plus fréquents sont liés à un faible nombre de cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes), à la diarrhée, à la fatigue et au manque d'énergie et de force.

ACÉTATE D'ABIRATÉRONNE

Les effets secondaires les plus fréquents sont la fatigue, les douleurs articulaires, l'hypertension artérielle, les nausées, les gonflements, les bouffées de chaleur, la diarrhée, les vomissements, les infections des voies respiratoires supérieures (comme un rhume), la toux et les maux de tête.

ENZALUTAMIDE

Les effets secondaires les plus fréquents sont les suivants : douleurs musculaires/articulaires, fatigue, bouffées de chaleur, constipation, diminution de l'appétit, diarrhée, hypertension artérielle, saignements, chutes, fractures et maux de tête.

Il ne s'agit pas là de tous les effets secondaires. Le médecin de l'étude pourra vous donner une brochure du patient contenant plus d'informations sur le médicament expérimental de l'étude.

