

Monitorare i propri cari per individuare eventuali effetti collaterali



Xaluritamig può causare effetti collaterali che possono essere gravi o pericolosi per la vita.

Chiamare immediatamente il medico dello studio o rivolgersi al pronto soccorso in caso di:

- Febbre (100,4°F/38,0°C o superiore)
- Brividi o fremiti di freddo
- Dolore al torace
- Difficoltà di respirazione e/o respiro corto
- Battito cardiaco accelerato
- Eruzione cutanea
- Nausea, vomito o diarrea
- Affaticamento o debolezza
- Mal di testa
- Vertigini o stordimento
- Confusione, cambiamenti comportamentali e del linguaggio



Xaluritamig può anche causare effetti collaterali che possono diventare gravi se non vengono diagnosticati e trattati tempestivamente.

I seguenti sintomi non sono pericolosi per la vita, ma se dovessero manifestarsi, si prega di chiamare il medico dello studio.

- Dolore e/o debolezza muscolare (che spesso colpisce braccia, spalle e gambe)
- Dolore e/o gonfiore agli occhi, al viso, alla mascella, alla gola/bocca o allo scroto/all'area genitale; vesciche/ferite alla bocca
- Nuovo dolore e/o gonfiore articolare o peggioramento di quello esistente

Lei è una parte importante di questo studio.

Come caregiver, Lei svolge un ruolo importante nel monitoraggio e nella cura del Suo caro. In questo studio, ci affideremo a Lei per controllare le condizioni del Suo caro e per aiutarlo a seguire le nostre istruzioni.

La Sua presenza, le Sue osservazioni e il Suo sostegno hanno un impatto significativo sul percorso del Suo caro affetto da carcinoma prostatico.

Non esiti a contattarci per qualsiasi domanda.

Con molta riconoscenza,

Il team dello Studio XALute

Il Suo medico dello studio:

Telefono: _____

Il Suo coordinatore dello studio:

Telefono: _____

E-mail: _____



Per maggiori informazioni scansionare il codice per visitare il sito [\[www.xalutestudy.com\]](http://www.xalutestudy.com)

Amgen - XALute Study - Caregiver Trifold - 12-SEP-2025 - Italian (Italy) - V3.0
[XALute-CGTF-V3-EnP]

XALute

Una guida per i caregiver dei pazienti dello studio XALute



Panoramica del Ciclo 1

Il Ciclo 1 include 4 visite dello studio. Il Suo caro riceverà un'infusione di xaluritamig ad ogni visita.

Giorno 1: Ricovero in ospedale

Il Suo caro sarà ricoverato in ospedale per la prima infusione e sarà monitorato per almeno 16 ore dopo la somministrazione. Il medico dello studio effettuerà un controllo finale sul Suo caro prima di dimetterlo dall'ospedale.



Giorni 8, 15, 22: Monitoraggio ambulatoriale

Per questi giorni di infusione non è richiesta la degenza in ospedale. Il medico e il personale dello studio monitoreranno il Suo caro per un minimo di 1-2 ore dopo l'infusione.



Durante il Ciclo 1, Lei e il Suo caro dovrete rimanere a una distanza di 1 ora dall'ospedale finché non saranno trascorse 24 ore dall'infusione.



Si assicuri che il Suo caro abbia sempre con sé la tessera del paziente nel portafoglio. La tessera elenca gli elementi da tenere in considerazione e i comportamenti da adottare in caso di effetti collaterali.



Ciclo 2 e successivi

Non è richiesta una degenza ospedaliera o un monitoraggio prolungato per le infusioni durante il Ciclo 2 e successivi. Il medico dello studio deciderà per quanto tempo monitorare il Suo caro e Le comunicherà cosa aspettarsi.



Imparando a riconoscere i sintomi e tenendo sotto stretta osservazione la persona cara, potrà contribuire a garantire che riceva rapidamente le cure mediche adeguate.



Prendersi cura della persona cara dopo un'infusione



Prestare attenzione ai segni e ai sintomi di una reazione.



Aiutare la persona cara a restare idratata. Consigliamo di bere 11 bicchieri o 2,5 litri di acqua al giorno.



Assicurarsi che il proprio caro assuma eventuali farmaci antinfiammatori secondo le istruzioni.



Essere disponibili per una telefonata di controllo 24 ore dopo l'infusione. Se necessario, questo può avvenire presso la clinica dello studio.



Chiamare immediatamente il medico dello studio o rivolgersi al pronto soccorso se il proprio caro manifesta uno dei sintomi elencati in precedenza in questo opuscolo.



Apprezziamo il Suo sostegno mentre collaboriamo per prenderci cura del Suo caro durante lo studio.

