

Należy zwracać uwagę na te oznaki i objawy!

Tak jak w przypadku wszystkich leków istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych wywołanych przez badany produkt leczniczy. Trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, i od razu zgłaszać lekarzowi prowadzącemu badanie wszelkie objawy lub zmiany w samopoczuciu. Szybkie rozpoznanie i leczenie mogą pomóc w ustąpieniu działań niepożądanych.

Złe samopoczucie

- Gorączka
- Dreszcze
- Ból głowy
- Zmęczenie
- Uczucie omdlenia lub zawroty głowy

Oczy

- Obrzęk wokół oczu
- Zażółcenie gałek ocznych

Serce

- Szybkie bicie serca

Mięśnie i stawy

- Dolegliwości bólowe
- Uczucie słabości

Skóra

- Wysypka
- Swędząca lub zażółcona skóra
- Pieczenie, uczucie kłucia lub mrowienie

Nogi i kostki

- Obrzęk

Problemy neurologiczne

- Utrata równowagi lub koordynacji
- Drżenie rąk i (lub) nóg
- Uczucie dezorientacji
- Problemy z mówieniem
- Utrata pamięci
- Zmiany osobowości

Jama ustna i smak

- Zmiana odczuwania smaku, który może być nieprzyjemny, kwaśny, słony lub metaliczny
- Pęcherze lub owrzodzenia
- Ból jamy ustnej

Gardło

- Ból lub obrzęk gardła

Brzuch

- Nudności lub wymioty
- Utrata apetytu
- Ból brzucha

Narządy płciowe

- Obrzęk moszny

Należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu badanie wszelkie niepokojące objawy.

Więcej informacji znajduje się na odwrocie.

ZALURYTAMIG

Zespół uwalniania cytokin (CRS) jest ważnym działaniem niepożądanym, na które należy zwracać uwagę podczas przyjmowania zalurytamigu. Objawy CRS obejmują gorączkę, dreszcze, ból głowy, niski poziom tlenu we krwi, zmiany ciśnienia krwi, przyspieszone tętno, nudności lub wymioty oraz podwyższony poziom enzymów wątrobowych.

W przypadku wystąpienia gorączki (38,0°C lub wyższej) albo innych objawów CRS należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym badanie lub udać się na do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Miejscowe stany zapalne, takie jak ból i stan zapalny mięśni, również są związane ze stosowaniem zalurytamigu i mogą powodować działania niepożądane, które wymagają szybkiego leczenia, aby zapobiec ich nasileniu. Objawy obejmują:

- Ból mięśni/stawów i (lub) osłabienie
- Ból i (lub) obrzęk wokół oczu, twarzy, szczęki, gardła/ust lub okolicy moszny / narządów płciowych;

Inne potencjalne działania niepożądane zalurytamigu opisano bardziej szczegółowo w formularzu świadomej zgody.

KABAZYTAKSEL

Najczęstsze działania niepożądane związane są z niską liczbą krwinek (czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi), biegunką, zmęczeniem oraz brakiem energii i siły.

OCTAN ABIRATERONU

Najczęstsze działania niepożądane obejmują zmęczenie, bóle stawów, wysokie ciśnienie krwi, nudności, obrzęk, uderzenia gorąca, biegunkę, wymioty, infekcje górnych dróg oddechowych (takie jak przeziębienie), kaszel i ból głowy.

ENZALUTAMID

Najczęstsze działania niepożądane to ból mięśni/stawów, zmęczenie, uderzenia gorąca, zaparcia, zmniejszony apetyt, biegunka, wysokie ciśnienie krwi, krwawienie, upadki, złamania i ból głowy.

Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane. Lekarz prowadzący badanie może przekazać ulotkę dla pacjenta zawierającą więcej informacji na temat badanego produktu leczniczego



Proszę zeskanować kod lub odwiedzić stronę [\[www.xalutestudy.com\]](http://www.xalutestudy.com), aby uzyskać więcej informacji związanych z badaniem.

Kod PIN: [0509]