

监测您的亲人是否出现副作用



Xaluritamig 可能会引起严重或危及生命的副作用。

如果出现以下情况, 请立即致电研究医生或寻求急救护理:

- 发烧 (100.4°F/38.0°C 或以上)
- 发冷或寒颤
- 胸痛
- 呼吸困难和/或呼吸急促
- 心跳加快
- 皮疹
- 恶心、呕吐或腹泻
- 疲劳或虚弱
- 头痛
- 眩晕或头重脚轻
- 思维混乱、行为改变和言语改变



另外, 如果不尽早诊断和治疗, Xaluritamig 所引起的副作用可能会加剧。

以下症状不会危及生命, 但如果出现, 请致电您的研究医生。

- 肌肉疼痛和/或无力 (通常影响手臂、肩膀和腿部)
- 眼睛、面部、下颌、喉咙/口腔或阴囊部位疼痛和/或肿胀; 口腔水疱/溃疡
- 出现新的关节疼痛和/或肿胀, 或原有的关节疼痛和/或肿胀加重

您是本研究的重要一员。

作为护理人员, 您在监测和护理亲人方面扮演着重要的角色。在本研究中, 我们将需要您来协助照护亲人的病情, 并帮助他们遵循我们的指示。

您的参与、观察和支持会对亲人的前列腺癌治疗之路产生巨大影响。

若有任何疑问, 请随时联系我们。

非常感谢,

XALute 研究团队

您的研究医生:

电话: _____

您的研究协调员:

电话: _____

电子邮件: _____



扫描二维码访问
www.xalutestudy.com,
了解更多信息。

Amgen - XALute Study - Caregiver Trifold - 12-SEP-2025 - Chinese (US) - V3.0
[XALute-CGTF-V3-EnP]

XALute

XALute 研究 参与者护理人员 指南



第 1 周期概述

第 1 周期包括 4 次研究访视。您的亲人将在每次访视时接受 Xaluritamig 输液。

第 1 天:住院一晚



您的亲人将住院接受第一次输液,输液后要接受至少 16 小时的监测。在让您的亲人出院之前,研究医生会对其进行最终检查。

第 8、15、22 天:门诊监测



这几个输液日不需要住院。输液后,研究医生和工作人员将会监测您的亲人至少 1 至 2 小时。



在第 1 周期,您和您的亲人需要在距离医院 1 小时车程的范围内驻留,直至输液 24 小时后。



确保您的亲人随身携带患者就诊卡。此卡列示了需要注意的事项以及出现副作用时应采取的措施。

第 2 周期及以后



第 2 周期及以后的输液无需住院或延长监测时间。研究医生将会决定对您亲人的监测时长并告知您需要做些什么。



通过了解需要注意的事项并密切关注您的亲人,您可以帮助确保其快速获得适当的医疗护理。

在输液后护理您的亲人



注意观察某种反应的体征和症状。



帮助您的亲人保持充足的水分。他们每天应喝 11 杯或 2.5 升水。



确保您的亲人遵医嘱服用消炎药。



输液 24 小时后可随时接听随访电话。如有需要,可在研究诊所进行随访。



如果您的亲人出现本手册上文所列的任何症状,请立即致电研究医生或寻求急救护理。



我们非常重视与您的合作,因为我们将与研究期间共同照护您的亲人。

