

注意以下徵象和症狀！

與任何藥物一樣，您的試驗藥物也可能會產生副作用。請務必瞭解應注意的事項，並在出現任何症狀或感覺發生變化時，立即向試驗醫生報告。及時診斷和治療有助於消除副作用。

感覺不適

- 發燒
- 發冷
- 頭痛
- 疲倦
- 感覺頭暈或眩暈

眼部

- 眼周腫脹
- 眼睛發黃

心臟

- 心跳加快

肌肉和關節

- 隱痛或疼痛
- 無力

皮膚

- 皮疹
- 皮膚發癢或發黃
- 灼燒感、刺痛感或
麻刺感

腿部和腳踝

- 腫脹

神經系統問題

- 失去平衡或協調能力
- 手臂和/或腿部顫抖
- 思維混亂或迷失方向
- 說話困難
- 記憶力減退
- 性格改變

口腔和味覺

- 味覺改變，可能會出現異味、酸味、鹹味或金屬味
- 水泡或潰瘍
- 口腔疼痛

喉嚨

- 喉嚨疼痛或腫脹

腹部

- 嘴心或嘔吐
- 食欲不振
- 腹痛

生殖器

- 陰囊腫脹

向試驗醫生報告任何困擾您的問題。

更多資訊請參見本頁背面。

XALURITAMIG

細胞因子釋放症候群 (CRS) 是接受 Xaluritamig 時需要注意的重要副作用。CRS 的症狀包括發燒、發冷、頭痛、低血氧、血壓變化、心率加快、噁心或嘔吐，以及肝酶升高。

如果您出現發燒 (100.4°F/38.0°C 或以上) 或任何其他 CRS 症狀，請聯絡您的試驗醫生或前往急診室。

肌肉疼痛和發炎等局部炎症事件也與 Xaluritamig 有關，並且可能會引起副作用，需要及時治療以防止病情惡化。症狀包括：

- 肌肉/關節疼痛和/或無力
- 眼睛、面部、下頷、喉嚨/口腔或陰囊/生殖器部位疼痛和/或腫脹。

您的知情同意書中更詳細地介紹了 Xaluritamig 的其他潛在副作用。

CABAZITAXEL

最常見的副作用與血細胞 (紅血球、白血球和血小板) 計數低、腹瀉、疲倦以及精力和體力不足有關。

醋酸阿比特龍

最常見的副作用包括疲倦、關節疼痛、高血壓、噁心、腫脹、潮熱、腹瀉、嘔吐、上呼吸道感染 (與普通感冒類似)、咳嗽和頭痛。

恩扎魯胺

最常見的副作用是肌肉/關節疼痛、疲倦、潮熱、便秘、食欲下降、腹瀉、高血壓、出血、跌倒、骨折和頭痛。

以上並非全部副作用。您的試驗醫生會向您提供一份患者手冊，其中包含了有關您的試驗藥物的更多資訊。



掃描代碼或造訪 www.xalutestudy.com

獲取更多試驗資訊。

PIN 碼:0509